


КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ І ТИХ, ХТО ЗДІЙСНЮЄ ДОГЛЯД ЗА НИМИ

ЦЯ КАРТКА НОСИТЬ ЛИШЕ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТУ СОЛІКВА ВИ МАЄТЕ ПРОЙТИ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА З ВИКОРИСТАННЯ ШПРИЦ-РУЧКИ, А ТАКОЖ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ.

Зберігайте цю картку. Вам може знадобитися переглянути її ще раз. Напишіть своє ім'я на цій картці: _____


СОЛІКВА ШПРИЦ-РУЧКА 10-40

СОЛІКВА 100 Од/мл + 50 МКГ/мл
РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ В ПОПЕРЕДНЬО
НАПОВНЕНІЙ ШПРИЦ-РУЧЦІ



СОЛІКВА ШПРИЦ-РУЧКА 30-60

СОЛІКВА 100 Од/мл + 33 МКГ/мл
РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ В ПОПЕРЕДНЬО
НАПОВНЕНІЙ ШПРИЦ-РУЧЦІ



Препарат СОЛІКВА доступний в двох попередньо наповнених шприц-ручках, кожна з яких містить ліксисенатид в 2 різних концентраціях та інсулін гларгін 100 Од/мл із різними діапазонами дозування. Ваш лікар призначив вам шприц-ручку відповідно до вашої потреби в інсуліні.

Шприц-ручкою СОЛІКВА вводять одночасно інсулін гларгін і ліксисенатид за одну ін'єкцію один раз на добу.

- Обидві попередньо наповнені шприц-ручки містять інсулін гларгін у концентрації 100 Од/мл.
- Шприц-ручка СОЛІКВА (10-40) дозволяє робити щоденні ін'єкції в діапазоні 10–40 поділок шкали (концентрація: інсулін гларгін 100 Од/мл і ліксисенатид 50 мкг/мл; діапазон доз: від 10 до 40 одиниць інсуліну гларгіну в поєднанні з 5–20 мкг ліксисенатиду). Ця шприц-ручка персикового кольору з оранжевою кнопкою для введення.
- Шприц-ручка СОЛІКВА (30-60) дозволяє робити щоденну ін'єкцію в діапазоні 30–60 поділок шкали (концентрація: інсулін гларгін 100 Од/мл і ліксисенатид 33 мкг/мл; діапазон доз: від 30 до 60 одиниць інсуліну гларгіну в комбінації з 10–20 мкг ліксисенатиду). Ця шприц-ручка оливкового кольору з коричневою кнопкою для введення.
- У рецепті повинно бути вказано, який тип попередньо наповненої шприц-ручки вам потрібен (шприц-ручка СОЛІКВА [10-40] або шприц-ручка СОЛІКВА [30-60]), і кількість поділок шкали, які потрібно ввести.
- Фармацевтичний працівник повинен з'ясувати в лікаря щодо рецепта, наповненого не повністю.
- Одна поділка шкали містить одну одиницю інсуліну гларгіну в концентрації 100 Од/мл плюс відповідну кількість ліксисенатиду. Перш ніж використовувати препарат СОЛІКВА, уточнюйте, скільки поділок шкали вам потрібно. Цю інформацію вам надає ваш лікар.
- Показчик дози попередньо наповненої шприц-ручки вказує на кількість поділок шкали, які потрібно ввести.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ І ТИХ, ХТО ЗДІЙСНЮЄ ДОГЛЯД ЗА НИМИ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

- Препарат СОЛІКВА випускається в попередньо наповненій шприц-ручці та повинен використовуватися тільки з цим пристроєм. Пацієнти, особи, які за ними доглядають, і медичні працівники ніколи не повинні використовувати шприц для забору препарату СОЛІКВА із попередньо наповненої шприц-ручки, щоб уникнути помилок дозування та завдання серйозної шкоди. Перед кожним використанням слід застосовувати нову голку. Голки не можна використовувати повторно.
- У препараті СОЛІКВА одна поділка шкали завжди містить одну одиницю інсуліну гларгіну в концентрації 100 Од/мл, незалежно від використовуваної попередньо наповненої шприц-ручки СОЛІКВА (шприц-ручки СОЛІКВА [10-40] або шприц-ручки СОЛІКВА [30-60]).
- Ваш лікар пояснить вам дизайн і функції шприц-ручки СОЛІКВА, зокрема, як покажчик дози попередньо наповненої шприц-ручки вказує на кількість поділок шкали, які потрібно ввести.
- При переході на цей тип комбінованих ліків і протягом декількох тижнів після цього слід частіше вимірювати рівень цукру в крові.
- Якщо у вас виникли питання щодо вашого лікування, зверніться до свого лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ ШПРИЦ-РУЧОК СОЛІКВА

- Невідкриті шприц-ручки СОЛІКВА можна зберігати в холодильнику до закінчення строку придатності; якщо шприц-ручку відкрито, то через 14 днів її слід знищити. Строк придатності – 24 місяці.

НЕВІДКРИТА ШПРИЦ-РУЧКА



Зберігати в холодильнику з закритим ковпачком при температурі від 2 °С до 8 °С, в оригінальній упаковці*



Можна зберігати в холодильнику до закінчення строку придатності



Не заморожувати†
Зберігати в зовнішній картонній упаковці, щоб захистити від світла



Утилізуйте після закінчення строку придатності

ВІДКРИТА ШПРИЦ-РУЧКА



Зберігати при кімнатній температурі не вище 30 °С



Відкриті шприц-ручку SoloStar® не можна зберігати в холодильнику або заморожувати



Уникайте впливу прямого світла та тепла. Після кожної ін'єкції закривайте шприц-ручку ковпачком



Утилізуйте через 14 днів після відкриття

* Перш ніж вводити препарат СОЛІКВА, вийміть шприц-ручку з холодильника хоча б за одну годину – введення холодного інсуліну може бути болісним.

† Слідкуйте за тим, щоб не заморожувати препарат СОЛІКВА. Не кладіть шприц-ручку в морозильну камеру або поруч із нею. Якщо ви побачите заморожені або крижані кристали в розчині СОЛІКВА, викиньте його.

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВВЕСТИ ПРЕПАРАТ СОЛІКВА



Уважно прочитайте інструкцію для медичного застосування.



Якщо не дотримуватись усіх цих інструкцій, ви можете отримати занадто багато або занадто мало препарату.

Якщо у вас виникли будь-які побічні реакції, повідомте лікаря або фармацевта. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не зазначених у цьому листку. Про побічні ефекти ви також можете повідомити компанію ТОВ «Санofi-Авентіс Україна» за адресою Pharmacovigilance-UA@sanofi.com.

Якщо у Вас виникли будь-які питання або необхідна додаткова інформація щодо препарату СОЛІКВА, будь ласка, звертайтеся у службу з питань забезпечення інформацією у ТОВ «Санofi-Авентіс Україна»: Тел: +380 44 354 20 00, e-mail: Medinfo.Ukraine@sanofi.com

Пацієнтів просять повідомляти про усі підозрювані побічні реакції у Державний експертний центр МОЗ України. Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства здоров'я охорони України»: вул. Антона Цедіка 14, м. Київ, 03057. Електронна форма карти-повідомлення знаходиться за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>.

СОЛІКВА, розчин для ін'єкцій, 100 Од./мл+50 мкг/мл, Р.П. № UA/16774/01/01, Наказ МОЗ України №1187 від 21.06.2018. Актуальна версія інструкції для медичного застосування за посиланням: <http://www.drzl.com.ua/>, last access 02.04.2020.

СОЛІКВА, розчин для ін'єкцій, 100 Од./мл+33 мкг/мл, Р.П. № UA/16775/01/01, Наказ МОЗ України №1187 від 21.06.2018. Актуальна версія інструкції для медичного застосування за посиланням: <http://www.drzl.com.ua/>, last access 02.04.2020.