

Номер телефону лікаря:

П.І.Б. лікаря, що проводить лікування:

Назва установи:

Дата першого призначення препарату Обаджіо®:

П.І.Б. пацієнта:

КАРТКА ПАЦІЄНТА

Ця Картка пацієнта містить важливу інформацію з безпеки, яку Ви повинні знати, якщо Ви отримувате лікування препаратом Обаджіо®. Повна інформація наведена в інструкції для медичного застосування.



Загальні рекомендації

Будь ласка, покажіть цю картку будь-якому лікарю або медичному працівнику, який надає Вам медичну допомогу (наприклад, якщо Вам знадобилася невідкладна медична допомога).

Один раз на добу

ОБАДЖІО®
(терифлуномід) 14 мг
Таблетки

SANOFI GENZYME 



Важливі побічні ефекти

Цей лікарський засіб може впливати на роботу печінки та певних клітин крові, які відіграють важливу роль у боротьбі Вашого організму з інфекціями. Тому до початку лікування та регулярно під час нього необхідно виконувати аналіз крові та перевіряти артеріальний тиск.

Негайно зверніться до Вашого лікаря, якщо у Вас виникнуть будь-які з нижчезазначених побічних ефектів:

- Пожовтіння шкіри або білків очей, темний колір сечі, нудота чи блювання і біль у животі. Це може вказувати на проблеми з печінкою.
- Висока температура, тремтіння, озноб, збільшені мигдалики, зменшений чи болісний відтік сечі або сплутаність свідомості. Це може вказувати на виникнення інфекції.



Лише для пацієнток жіночої статі: Вагітність

- Не слід розпочинати терапію препаратом Обаджіо®, якщо Ви вагітні або підозрюєте вагітність. Ваш лікар може попросити Вас виконати тест на вагітність, щоб з'ясувати це.
 - Використовуйте надійний метод контрацепції під час терапії препаратом Обаджіо®.
- Якщо Ви завагітнієте або будете підозрювати, що вагітні, **негайно зверніться до свого лікаря.**
 - У разі вагітності лікар може запропонувати Вам прийняти певні лікарські засоби для швидкого та максимального виведення препарату Обаджіо® з Вашого організму.
 - Якщо Ви плануєте годувати дитину груддю або годуєте дитину груддю, Ви також повинні обговорити це з Вашим лікарем.